

BAREM

Examenul de angajare ca medic specialist

Sesiunea 15 mai 2023

Proba scrisă

Subiecte

1. Enumerati tulburările acute inițiale post TCC sau aparute dupa un anumit interval scurt.
2. Enumerati sindroamele psihice din ASC (ateroscleroza) cerebrală.
3. Clinica deliriumului infectios.
4. Enumerati tulburările psihice din sarcina si perioada post-partum.
5. Tratamentul sevrajului etanolic necomplikit.
6. Atacul de panica. Enumerati simptomele conform DSM-IV.
7. Tratamentul farmacologic al insomniei.
8. Rolul medicului de familie in managementul dementei.
9. Tratamentul farmacologic al sindromul discomportamental violent (agitatie psihomotorie).
10. Clasificarea retardului mental in functie de QI.

SUB 1. Enumerati tulburările acute inițiale post TCC sau dupa un anumit interval.

1. cantitative : **5 puncte**

1. coma **1.33punct**
 2. stupor **1.33punct**
 3. Obnubilare definitie **1.33punct**
2. calitative: **5 puncte**
1. stari crepusculare **1.33punct**
 2. delirul traumatic **1.33punct**
 3. starile oneiroide **1.33punct**

SUB 2. Enumerati sindroamele psihice din ASC (ateroscleroza) cerebrală.

1. sindromul depresiv **1.66puncte**
2. sindromul maniacal **1.66puncte**
3. sindromul confuziv **1.66puncte**
4. sindromul paranoid(halucinator delirant) **1.66puncte**
5. sindromul pseudodemential **1.66puncte**
6. sindromul demential (dementa vasculara ischemica subcorticala) **1.66puncte**

SUB 3. Clinica deliriumului infectios.

1. Tulburari ale dispozitie: anxietate, euforie, agitatie, logoree **2.5puncte**
2. Agitatie datorita tulburarilor halucinatorii si tulburarilor de tip delirant **2.5puncte**
3. Catalepsie **2.5puncte**
4. Sindrom delirant-confuzional mergand pana la stupor si coma **2.5puncte**

SUB 4. Enumerati tulburarile psihice din sarcina si perioada post-partum.

1. tulburari nevrotiforme (tulburarea de adaptare, fobii, tulburarea de somatizare, anxietate, depresie) **5puncte**
2. tulburari psihotice - stari delirante, depresii cu elemente psihotice, episod psihotic, episod maniacal, stari schizofreniforme **5puncte**

SUB 5. Tratamentul sevrajului etanolic necomplikit.

1. benzodiazepine (diazepam inj, lorazepam inj, diazepam comprimate, lorazepam comprimate) **5puncte**
2. suport hidroelectrolitic si vitaminic (vit B1, B6, E, B12, C) **5puncte**

SUB 6. Atacul de panica. Enumerati simptomele conform DSM-IV.

1. palpitatii **0.76puncte**
2. transpiratii **0.76puncte**
3. tremor **0.76puncte**
4. senzatie de scurtare a respiratiei **0.76puncte**
5. senzatie de sufocare **0.76puncte**
6. durere precordiala **0.76puncte**
7. greata **0.76puncte**
8. senzatie de ameteala, vertij **0.76puncte**
9. derealizare, depersonalizare **0.76puncte**
10. frica de pierdere a controlului **0.76puncte**
11. frica de a muri **0.76puncte**
12. parestezii **0.76puncte**
13. frisoane **0.76puncte**

SUB 7.Tratamentul farmacologic al insomniei.

1. inductoare de somn (zolpidemum , zopiclonom,) **2puncte**
2. benzodiazepine (nitrazepam, cinolazepamum, bromazepamum, etc) **2puncte**
3. barbiturice (fenobarbital) si non-barbiturice-benzodiazepinice (hidroxizin, meprobamat, glutetimid) **2puncte**
4. sedative de tip antidepresiv (trazodonum, mirtazapinum) **2puncte**
5. sedative de tip antipsihotic cu tip scurt (quetiapinum IR, etc) **2puncte**

SUB 8. Rolul medicului de familie in managementul dementei.

1. preventie – identificare sindrom cognitiv si analize (TC si RMN) **2.5puncte**
2. indrumare catre specialist (neurolog, psihiatru, geriatru) **2.5pc**
3. continuarea tratamentului recomandat de specialist **2.5puncte**
4. monitorizarea evolutiei bolii retrimitere catre specialist in caz de acutizare **2.5puncte**

SUB 9.Tratamentul farmacologic al sindromul discomportamental violent (agitatie psihomotorie).

1. Barbituric – (fenobarbital inj) **3puncte**
2. Benzodiazepinic (diazepam inj) **3puncte**
3. Antipsihotice sedative – haloperidol inj , antipsihotic atipic inj (olanzapina inj , aripiprazolum inj) **3puncte**

SUB 10. Clasificarea retardului mental in functie de QI.

1. Retard mental usor 69-50/55 **2.5puncte**
2. Retard mental moderat 50/55-30/35 **2.5puncte**
3. Retard mental sever 30/35-20/25 **2.5puncte**
4. Retard mental profund < 20/25 **2.5puncte**